

المحاضرة الثالثة

الهيدروجين H₂

ما هو عنصر الهيدروجين : هو عنصر كيميائي له الرمز H وله العدد الذري 1. يقع الهيدروجين في

الجدول الدوري ضمن عناصر الدورة الأولى وفوق عناصر المجموعة الأولى. في الظروف القياسية من الضغط والحرارة يكون الهيدروجين غازاً عديم اللون والرائحة، سريع الاشتعال، غير سام، ثنائي الذرة أحادي التكافؤ له الصيغة الجزيئية H₂.

تاريخ اكتشافه :

يعود الفضل في اكتشاف الهيدروجين إلى العالم هنري كافيندش وذلك عام 1766 حيث عرف الهيدروجين لأول مرة كمادة متميزة عن غيرها من الغازات القابلة للاشتعال. سمى كافيندش الغاز المنطلق الناتج عن تفاعل الفلزات مع الأحماض بالهواء القابل للاشتعال (الهواء الملتهب)، برهن العالم (كافندش) بأن الغاز نفسه يتكون من فعل الحامض المخفف في الحديد والخاصين والقصدير وان له خواص معينة في عام 1783، قام العالم أنطوان لافوازييه بمنح العنصر المكتشف اسم الهيدروجين، وذلك باشتقاق التسمية من الإغريقية، حيث أن لفظة هيدرو تعني ماء ولفظة جين تعني مكوّن أو مولّد اي (مولد الماء)

وجوده

يوجد (H₂) بكميات قليلة بين الغازات المنبعثة من البراكين ولكن كثرة وجوده مع الغازات المحيطة بالشمس وبغيرها من الكواكب . ويوجد بكميات صغيرة جداً في الهواء الجوي تقدر نسبته واحد الى عشرين الف وتزداد هذه النسبة في طبقات الجو العليا (لأنه أخف الغازات) ان مركبات الهيدروجين كثيرة جداً ويدخل في تركيب عدد هائل من المركبات لا سيما العضوية منها كالدهن والخشب والورق والنشاء والبتروول والحوامض وغيرها .

موقعه بالجدول الدوري:

للهيدروجين موقع فريد بين جميع العناصر المشكلة للجدول الدوري وذلك لأنه:
1 - أخف العناصر وذو تركيب بسيط.

2 - ذو بنية إلكترونية 1s¹ : H¹ وله شكلان أحدهما أيون H⁺ والثاني أيون هيدريد H⁻

تقرب بنيته من بنية عناصر المجموعة الأولى (مجموعة الفلزات القلوية) والتي تحتوي على إلكترون واحد في مدار الطبقة الخارجية 1s . هذا الإلكترون قابل لأن تفقده هذه العناصر بسهولة فتتحول بذلك إلى أيون


كيمياء العناصر الممثلة النظري - المرحلة الثانية كيمياء

موجب M^+ والهيدروجين يشبه عناصر الفصيلة (VII-A) لكونه يحتاج إلى إلكترون واحد لكي يصل إلى تركيب الغاز الخامل الذي يليه وهو الهليوم ويشكل بذلك الهيدريد السالب والذي يعطى الهيدريدات باتحاده مع العناصر الكهربائية الموجبة القوية ويكون أحادي التكافؤ ذو درجة أكسده (-1) لذلك نجد أن الهيدروجين يأخذ مكانه فوق العناصر القلوية أو فوق العناصر الهالوجينية في أغلب جداول الترتيب الدوري للعناصر

تحضير غاز الهيدروجين في المختبر

1 - **من التحلل الكهربائي للماء** : يتم بعد اضافة كمية قليلة من H_2SO_4 للماء لزيادة قدرته على توصيل التيار الكهربائي حيث يتحرر غازي (H_2) (O_2) عند قطبي الكاثود والانود على التوالي ويكون حجم (H_2) ضعف (O_2) .

2 **من تفاعل بعض الفلزات مع الماء** : ان العناصر الفلزية التي تقع فوق الهيدروجين في جدول الاحلال تستطيع ان تحل محل الهيدروجين في الماء وقد يتحرر كليا او جزئيا الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم تحرر (H_2) عند وضعها في الماء مكونه هيدروكسيداتهما



اما المنغنسيوم والحديد فانهما يتفاعلان مع بخار الماء الساخن ويتحرر (H_2) كما في المعادلات اعلاه .



اما النحاس فلا تاثير له على بخار الماء الساخن ولا يتحرر غاز (H_2) ولا يتأكسد النحاس (لماذا)

3 **من تفاعل بعض الفلزات مع الحوامض** : اغلب الحوامض تحوي في تركيبها عنصر الهيدروجين ويمكن ابداله بفلز ويستخدم لهذا الغرض الحديد والخاصين بسبب رخص ثمنها ومن الحوامض المستخدمة HCl , H_2SO_4 المخففين ولا بد من الاشاره الى ان العناصر التي تقع فوق الهيدروجين في جدول الاحلال هي التي تحرره فقط،




* كما لا يستخدم الحوامض المؤكسده مثل HNO_3 لهذا الغرض لانها تؤكسد (H_2) المتحرر الى ماء

4 **يحضر (H_2) من تفاعل الفلزات الامفوتيرية مع القواعد (القلويات)** : مثل الالمنيوم (Al) والقصدير (Sn)



تحضير الهيدروجين صناعياً

يحضر الهيدروجين صناعياً بطريقة (بوش) (Bosch) وذلك بإزالة غاز (CO) من غاز الماء وغاز الماء هو خليط من (CO , H₂) ويحضر من إمرار بخار الماء فوق فحم الكوك الساخن إلى درجة الاحمرار وإزالة (CO) يضاف إلى الخليط كمية من بخار الماء ويمرر فوق برادة الحديد كعامل مساعد حيث يتأكسد CO إلى CO₂ ثم يزال CO₂ برج الغازات مع الماء تحت ضغط (30) جو حيث يذوب CO₂ تاركاً (H₂)



الصفات الكيميائية للهيدروجين:

تفاعل الهيدروجين مع العناصر البسيطة :

1 - مع الهالوجينات



2 - مع الأكسجين :

يحترق الهيدروجين مع الأكسجين معطياً الماء




3 - مع النيتروجين :

عند تفاعل الهيدروجين مع النيتروجين يكون التفاعل متوازناً (انعكاسياً) .



4 - مع الفلزات :



يتفاعل الهيدروجين مع الفلزات القلوية والقلوية الترابية عند درجة حرارة تراوح ما بين 150° و 700°م وتحصل بذلك على هيدريدات الفلزات مثل LiH , NaH وهي مركبات أيونية وتتفكك بالحرارة كما أنها تتحلل بالماء مطلقة الهيدروجين .





5 - تفاعل الهيدروجين مع العناصر المركبة

يختزل الهيدروجين الأكاسيد مشكلاً الماء :

كيمياء العناصر الممثلة النظري - المرحلة الثانية كيمياء



6 - مع المركبات الكربونية :



خواص الهيدروجين

- 1 - جزيئة الهيدروجين خطية ومتناظرة ويحتوي على أصرة تساهمية
 - 2 - الكثافة النسبية لـ $\text{H}_2 = 1$ ووزنه اللتر الواحد منه تحت ض.ق = 0.09 غم ودرجة غليانه (-253) م
 - 3 - وهو اخف الغازات وليس له لون او طعم او رائحه واخف من الهواء بحوالي (14.5) مرة وقليل الذوبان في الماء ووزنه النوعي = 0.08 وعند تبريده الى (-259) م يتجمد الى بلورات
 - 4 يشتعل في الهواء بلهب ازرق فاتح جدا مكون الماء .
 - 5 - الهيدروجين قليل الفعالية في درجات الحرارة الاعتيادية ولا يتفاعل مع الاوكسجين الا بوجود عامل مساعد مثل البلاتين ولكن التفاعل يصبح واضحا عند (180)م ويصبح مفرقا عند (550) م
 - 6 وللهيدروجين ميل كبير لاختزال المركبات الاوكسجينية حيث يتحد مع الاوكسجين تك المركبات مكونا الماء
 - 7 - في ظروف خاصة يتحد (H_2) مع عدد من الفلزات مكونا مركبات مهمة مثل (HX) و H_2S , NH_3
 - 8 - يتفاعل مع الفلزات الساخنه مكونا صنفا من المركبات التي تسمى بالهيدريدات مثل هيدروكسيد الصوديوم (NaH) وهيدريد الكالسيوم (CaH_2) وغيرها .
- ان الهيدروجين الجزيئي (H_2) يكون عديم الفعالية في درجات الحرارة الاعتيادية وسبب ذلك هو طاقة الاصرة ($\text{H} \cdots \text{H}$) العالية والتي تبلغ (436) كج/مول الا انه عند درجات الحرارة العالية يتحد مباشرة او بوجود عامل مساعد مع معظم العناصر مكون معها مركبات مختلفة.

خواصه الاستثنائية

- بالنظر كون (H_2) لا يتلائم مع بقية الزمر في الجول الدوري يمكن اعتباره مقدمة للتصنيف الدوري للعناصر الا انه يظهر تشابها ملحوظا مع ثلاث من الزمر في الجدول الدوري وكما يلي :
- 1 - يظهر (H_2) ميلا لاكتساب الكترون واحد ليكون ايون الهيدريد السالب (H^-) وبذلك فهو يشبه الهالوجينات (X^-) (F^- , Cl , Br , I^-) .
 - 2 - قد يفقد (H_2) الكترون واحد ليكون ايونا موجبا (H^+) وهو بذلك يشابه العناصر القلوية مثل (Na^+ , K^+) .
 - 3 - للهيدروجين غلاف تكافؤي نصف مشبع ($1s^1$) وله القدرة على تكوين اواصر تساهمية مع العديد من العناصر وبذلك فهو يشابه زمرة الكربون .

نظائر الهيدروجين :


كيمياء العناصر الممثلة النظري - المرحلة الثانية كيمياء

للهدروجين ثلاث نظائر مهمة هي :

النظير H^1_1 : وهو هيدروجين خفيف يتكون من بروتون وإلكترون ويدعى بالهدروجين الاعتيادي النظير H^1_1 :

النظير D^2_1 : وهو هيدروجين ثقيل ويتكون من بروتون ونيوترون وإلكترون ويدعى بالديوتيريوم

النظير H^3_1 : وهو هيدروجين ثقيل يتكون من بروتون ونيوترونين وإلكترون ويدعى بالتريتيوم T^3_1




هيدروجين-1	هيدروجين-2	هيدروجين-3
1p 0n	1p 1n	1p 2n
1_1H	2_1H	3_1H
1	2	3
العدد الكتلي	H	العدد الذري

الهيدريدات:

1- الهيدريدات الأيونية (شبيمة الاملاح) :- وتتكون نتيجة ارتباط الهيدروجين مع العناصر ذات

الكهروسلبية الضعيفة وتشمل العناصر القلوية والقلوية الترابية وهذه الهيدريدات لها درجة انصهار عالية ومصهورها يوصل التيار الكهربائي وهي عوامل مختزلة قوية تتفاعل مع الماء ويتصاعد الهيدروجين. ومن أمثلتها SiH_4 , CaH_2 , NaH



2- الهيدريدات التساهمية :

وتتكون نتيجة ارتباط الهيدروجين مع العناصر ذات الكهروسلبية العالية مثل عناصر القطاع P وهي مركبات لينة- لها درجات منخفضة من حيث الانصهار والغليان والتطاير وعدم القدرة على التوصيل وتركيبها $XH_{(n)}$ حيث (n) رقم المجموعة في الجدول الدوري حيث ينتمي العنصر X (B_2H_6 , AlH_3) .

3- الهيدريدات الفلزية (الفراغية)


حيث يحتل الهيدروجين الفراغ البيني في التركيب البلوري للعنصر حيث يتواجد الهيدروجين في الحالة الذرية وتركيبها الكيميائي ليس قياسياً (متغير) وهي تشبه خواص الفلز الأصلي فتكون نتيجة ارتباط الهيدروجين مع عناصر القطاع-(d) و Be و Mg من عناصر القطاع S . من أمثلتها هيدريد النيكل NiH_2 وهيدريد البلاديوم PdH_2 حيث تختفي جزيئات الهيدروجين في فراغات التركيب البلوري لكل من النيكل أو البلاديوم .

الأصرة الهيدروجينية:

تتكون عند اتحاد **الهيدروجين** مع عناصر ذات كهروسلبية عالية مثل الهالوجينات **والأوكسجين** تكون الأصرة التساهمية وهذه العناصر ذات قطبية عالية نظراً للفارق الكبير في الكهروسلبية مما يؤدي إلى ظهور **شحنة** جزئية موجبة على ذرة الهيدروجين مكوناً قطباً موجباً وشحنة جزئية سالبة على ذرة العنصر الآخر وبسبب وجود هذه القطبية العالية فإن أحد طرفي الجزيئة المستقطبة سوف تتجاذب مع طرف جزئية مجاورة تحمل شحنة جزئية مغايرة وهكذا فإن أطراف الجزيئات التي تحمل شحنة سالبة سوف تتجاذب مع أطراف جزيئات تحمل شحنة جزئية موجبة والعكس صحيح ويرمز لها عادة بخط منقط(0.0000).

الرابطة الهيدروجينية

عبارة عن تجاذب كهربى ضعيف بين جزيئات المركب التساهمي القطبي المحتوي على ذرة هيدروجين .
مثال : الرابطة الهيدروجينية في الماء



وكما يتضح من المثال فإن الرابطة الهيدروجينية تربط الجزء السالب (ذرة ذات سالبية كهربية عالية) في جزيء المادة بالطرف الموجب (ذرة هيدروجين) في جزيء آخر .

أثر الرابطة الهيدروجينية على خواص المادة

تؤثر الروابط الهيدروجينية على الخواص الطبيعية للمادة ، فدرجات غليان وانصهار المواد المحتوية على روابط هيدروجينية أعلى من درجات غليان وانصهار مثيلاتها من المواد ويبرز هذا الأثر بشكل واضح في خواص الماء ، فللماء صفات خاصة ترجع إلى الروابط الهيدروجينية المميزة التي تربط بين جزيئاته ، **فدرجة غليان الماء 100 (درجة م)** مرتفعة جداً إذا ما قورنت بدرجات غليان مركبات عناصر المجموعة السادسة مع الهيدروجين بالرغم من أن الوزن الجزيء للماء أقل من الوزن الجزيء لهذه المركبات .

استخدامات الهيدروجين :

1. في تحضير كلوريد الهيدروجين HCl وفي صناعة NH₃ .
2. في تحويل الكربون إلى هيدروكربونات .
3. تحويل الزيوت إلى دهون
4. تحضير الكحول الميثيلي CH₃OH من أول أكسيد الكربون CO
5. يستخدم في صناعة وقود الصواريخ والمركبات الفضائية
6. يستخدم لهب الهيدروجين الذري في صهر ولحام المعادن الشعة الاوكسي-هيدروجينية
7. تحضير بعض الفلزات باختزال مركباتها