



## الأنزيمات ناقلة مجموعة الأمين Transaminases

Glutamate Pyruvate Transaminase ( GPT ) or Alanine Transaminase ( Al T )

Glutamate Oxaloacetate Transaminase ( GOT ) or Aspartate Transaminase ( AsT )

### التصنيف Classification

ينتمي انزيمي ( GPT & GOT ) الى مجموعة الانزيمات المسماة ناقلة مجموعة الامين ( Transaminases ) وهي تنتمي الى مجموعة الانزيمات المسماة ( Transferases ) وقد سميت بهذا الاسم نظرا لعملها داخل الجسم على نقل مجموعة الأمين (  $\text{NH}_2$  ) من حامض اميني الى حامض كربوكسيلي الفا كيتوني (  $\alpha$ -Keto carboxylic acid ) وينتج عن هذه العملية تحول الحامض الاميني الى حامض الفا كيتوني بينما يتحول الحامض الالف كيتوني الى حامض اميني جديد وتعتبر هذه العملية احد العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسم الانسان ضمن عمليات ايض المواد البروتينيه مع العلم بان التفاعل الذي يحدثه كلا الأنزيمين يعد من التفاعلات العكسيه ( Reversible reaction ) للحصول على حاجة الجسم من احدى طرفي التفاعل ويمكن توضيح عمل كلا الأنزيمين وفق المعادلتين التاليتين



## انزيم GPT او AIT :

### ( Glutamate Pyruvate Transaminase or Alanine Transaminase )

#### وجود انزيم ال GPT في جسم الانسان :

يوجد انزيم ال GPT يصوره طبيعيه في عدد من انسجة الجسم المختلفه مثل خلايا الكبد بصوره رئيسيه وعضلة القلب ( Cardiac muscle ) وعضلات الهيكل العظمي ( Skeletal muscle ) والكلية كما يكون ايضا موجود في بلازما الدم وفي مادة الصفراء ( Bile ) وفي سائل النخاع الشوكي ( Cerebrospinal fluid ) ومما سبق يتبين ان المصدر الرئيس لهذا الانزيم في مصل الدم يكون من خلايا الكبد ومن ثم عضلة القلب

#### خواص انزيم GPT : Properties of GPT enzyme

- ١) يعمل انزيم ال GPT على الحامض الأميني Alanine اضافة الى الحامض الألفا كيتوني ( الألفا كيتو كلوتاريك ) ويطلق على المادة او المواد التي يعمل عليها الانزيم بالمادة الاساس ( Substrate )
- ٢) تكون افضل فعالية لانزيم ال GPT عند درجة حراره ٣٧ درجة مئوية وعند تركيز هيدروجيني ( pH ) قاعدي خفيف ( pH = 7.4 )
- ٣) معظم المواد المانعه للتخثر يكون لها تاثير على فعالية هذا الانزيم مثل الاوكسلات ( Oxalate ) والخلات ( Citrate ) ولذلك وعند قياس فعاليته مختبريا يفضل استخدام مصل الدم ولا تستخدم بلازما الدم
- ٤) يكون هذا الانزيم حساسا جدا لدرجات الحراره المختلفه فهو يكون ثابتا لمدة ثلاثه ايام عند درجة حراره ٢٥ درجة مئوية
- اسبوع عند حفظه في ثلاجه عند درجة حراره من ٤ الى ٥ درجات مئوية
- شهر عند حفظه في درجة التجميد ( - ٢٥ درجة مئوية )
- ٥) تكون فعالية انزيم ال GPT اقل من مثيلتها بالنسبه لانزيم ال GOT وتحت نفس الظروف الطبيعيه

#### الاهميه السريري لـانزيم ال GPT :

Normal value GOT activity = 2 – 15 I.U. / I serum

= 2 – 38 micromole / mints / I serum )

عادة لا يحدث اي انخفاض في مستوى فعالية الانزيم في مصل الدم في الحالات المرضيه ولكن فقط ارتفاع وذلك كون هذا الانزيم يعتبر من الانزيمات الداخل خلويه اي ان عملها داخل الخليه وتتركز الاهميه السريري لقياس فعالية انزيم GPT في مصل الدم في علاقته المباشره بأمراض الكبد فالبرغم من ان انزيم GOT وكما ستعرف لاحقا يرتفع ايضا في حالة امراض الكبد الناتجه عن حدوث تلف في خلاياه ومع ذلك يظل انزيم GPT هو الاكثر اهميه وخصوصيه في امراض الكبد وذلك لكونه من النادر ان يرتفع مستوى فعاليته في مصل الدم في اية امراض اخرى رغم وجوده في العديد من الانسجه اضافه الى ان ارتفاع مستوى فعاليته يدوم لفتره طويله من تلك الخاصه بانزيم GOT في حالة الامراض الكبديه

ومن اهم امراض الكبد التي يحدث خلالها ارتفاع ملحوظ في مستوى فعالية انزيم GPT

- التهاب الكبد المعدي Infectious hepatitis حيث يحدث تلف في خلايا الكبد مما يؤدي الى تسرب انزيم GPT الى الدم مما يسبب زياده ملحوظه في فعاليته بالدم
- تليف الكبد Liver cirrhosis
- تليف قناة الصفراء Biliary cirrhosis
- اليرقان الانسدادي Obstructive jaundice
- سرطان الكبد Liver cancer حيث تعزى الزياده في فعالية الانزيم في مصل الدم الى الزياده غير الطبيعيه للخلايا السرطانيه بالكبد

## انزيم GOT او AsT:

( Glutamate Oxaloacetate Transaminase or Aspartate Transaminase )

### وجود انزيم ال GOT في جسم الانسان :

يوجد انزيم ال GOT يصوره طبيعياً في عدد من انسجة الجسم المختلفة مثل عضلة القلب ( Cardiac muscle ) والتي تحتوي خلاياها على اكبر كميته من هذا الانزيم كما يوجد ايضا في خلايا الكبد وعضلات الهيكل العظمي ( Skeletal muscle ) والكلية كما يكون ايضا موجود في بلازما الدم وفي مادة الصفراء ( Bile ) وفي سائل النخاع الشوكي ( Cerebrospinal fluid ) ومما سبق يتبين ان المصدر الرئيس لهذا الانزيم في مصل الدم يكون من خلايا عضلة القلب ومن ثم الكبد

### خواص انزيم GOT : Properties of GOT enzyme

- (١) يعمل انزيم ال GOT على المادة الاساس المتكونه من الحامض الأميني Aspartic acid اضافة الى الحامض الالفا كيتوني ( الالفا كيتو كلوتاريك )
- (٢) تكون افضل فعاليته لانزيم ال GOT عند درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية وعند تركيز هيدروجيني ( pH ) قاعدي خفيف ( pH = 7.4 )
- (٣) معظم المواد المانعة للتخثر يكون لها تأثير على فعالية هذا الانزيم مثل الاوكسلات ( Oxalate ) والخلات ( Citrate ) ولذلك وعند قياس فعاليته مختبرياً يفضل استخدام مصل الدم ولا تستخدم بلازما الدم
- (٤) يكون هذا الانزيم حساساً جداً لدرجات الحرارة المختلفة فهو يكون ثابتاً لمدة  
• ثلاثة ايام عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية  
• اسبوع عند حفظه في ثلاجة عند درجة حرارة من ٤ الى ٥ درجات مئوية  
• شهر عند حفظه في درجة التجميد ( - ٢٥ درجة مئوية )
- (٥) تكون فعالية انزيم ال GOT اعلى من مثيلتها بالنسبة لانزيم ال GPT وتحت نفس الظروف الطبيعية

### الاهمية السريرية لانزيم ال GOT :

Normal value GOT activity = 2 – 20 I.U. / I serum

= 2 – 23 micromole / mints / I serum )

عادة لا يحدث اي انخفاض في مستوى فعالية الانزيم في مصل الدم في الحالات المرضية ولكن فقط ارتفاع ذلك كون هذا الانزيم يعتبر من الانزيمات الداخل خلوية اي ان عملها داخل الخلية

ونظراً لكون عضلة القلب هي اهم واكبر مصدر لانزيم GOT وكما اوضحنا سابقاً فلذلك نجد ان اهمية تقدير هذا الانزيم تأتي في التشخيص السريري لأمراض القلب بالدرجة الاولى حيث يكون له خصوصية كبيره في هذا المجال

ويمكن ايجاز الاهمية السريرية لهذا الانزيم كما سنوضح ادناه

#### (١) أمراض القلب : Heart diseases

ومن اهم الامراض القلبية التي يرتفع فيها مستوى فعالية انزيم ال GOT عن المستوى الطبيعي هو مرض احتشاء العضلة القلبية ( Myocardial infraction ) حيث يحدث تلف في خلايا العضلة القلبية مما يؤدي الى انطلاق الانزيم من خلايا العضلة القلبية الى الدم حيث يرتفع مستواه بالدم بصورة واضحة خلال ٤ – ٦ ساعات من بداية الالم المتمركز في المنطقة الصدرية ويبدأ في الارتفاع حتى يصل الى اعلى مستوياته خلال ٢٤ الى ٣٦ ساعة من بداية الازمة القلبية وقد يصل مستواه الى ٥ – ٨ اضعاف مستواه الطبيعي ثم يبدأ في الانخفاض التدريجي حتى يصل الى مستواه الطبيعي عند اليوم الرابع او الخامس من بداية الازمة بشرط عدم وجود اية مضاعفات كحدوث احتشاء قلبي جديد  
وتعتبر المستويات العاليه من هذا الانزيم ( ١٠ – ١٥ ضعف من المستوى الطبيعي ) مهلكه للانسان وغالباً ما تؤدي للوفاة حيث ان ذلك يدل على تلف شديد اصاب خلايا العضلة القلبية .

## ٢) امراض الكبد Liver diseases :

ويعزى ارتفاع مستوى انزيم GOT الى انطلاقه من خلايا الكبد عند تلفها الى الدوره الدمويه ومن اهم امراض الكبد التي يرتفع فيها مستوى فعالية انزيم GOT بالدم

- التهاب الكبد الفيروسي ( Viral hepatitis )
- تليف الكبد ( Liver cirrhosis )
- سرطان الكبد ( Liver cancer )
- اليرقان الانسدادي ( Obstructive jaundice )
- انسداد قناة الصفراء ( Biliary Obstruction )

## ٣) الأمراض العضليه Muscular diseases :

حيث قد يصل مستوى فعاليته في مصّل الدم الى ثمانية اضعاف مستواه الطبيعي ومن اهم هذه الامراض :

- مرض اضمحلال العضلات ( Muscular Dystrophy )
- التهاب الجلدي العضلي ( Dermatomyositis )

### ملاحظه هامه :

مما سبق نتبين ان كل من انزيم GOT وانزيم GPT قد يرتفع مستوى فعاليتهما معا في امراض القلب وكذلك امراض الكبد في مصّل الدم لكون كلاهما موجود في كل من خلايا الكبد وخلايا عضلة القلب ولكن نجد انه في حالة امراض الكبد تكون الزيادة في فعالية انزيم GPT هي الاكثر بينما في امراض القلب تكون الزيادة في فعالية انزيم GOT هي الملحوظه ولذلك ومن خلال ايجاد علاقته رياضيه بينهما يمكن ان نفرق بين حاله المرضيه سواء كانت بالكبد ام بالقلب

GOT / GPT = 1 – 1.3 in normal cases

= more than 1.3 in heart diseases

= less than 1 in Liver diseases

## وحدة قياس فعالية انزيمي GOT & GPT :

ان كمية الانزيم لاتعني اي اهميه للتعرف على وجود خلل مرضي فالانزيمات هي مركبات بروتينه تساعد على حدوث التفاعلات الكيميائيه الحياتيه الاساسيه داخل جسم الانسان والكميات القليله منه قد تعطي نتائج كبيره ولذلك فان فعالية الانزيم هي الاساس فلذلك ولهذا السبب اتفق على اساس قياس الانزيمات بصوره عامه بوحدات خاصه تقيس فعاليتها تسمى بالوحدات الانزيميه ( Enzymatic unit ) وتعرف بالوحدات العالميه ( International unit )

وفي حالة انزيمي GPT و GOT يتم قياس فعالية كل منهما بالوحده العالميه المسماة ( International unit ) والتي يرمز لها بالرمز ( I.U. ) وتعرف هذه الوحده بانها فعالية الانزيم الذي ينتج ١ ميكرومول من حامض البيروفيك ( Pyruvic acid ) خلال دقيقه واحده عند ظروف التفاعل وهي ٣٧ درجه منويه وتركيز هيدروجيني ( pH = 7.4 ) في اللتر الواحد